ultures



AVERTISSEMENTS AGRICOLES



POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°12 du 24 juin 2005 - 2 pages

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D'ARMOR

On ne rencontre, cette semaine encore, toujours pas de pucerons, ou très peu, et les auxiliaires sont un peu présents.

Aucune intervention n'est donc justifiée.

FINISTERE

lutte raisonnée

Les populations de pucerons verts stagnent à des niveaux très faibles, tandis que les pucerons noirs sont de plus en plus présents. Les pucerons ailés restent cependant peu nombreux. Le parasitisme est faible, mais présent, et devrait contenir les populations de pucerons.

Aucune intervention n'est donc nécessaire pour le moment excepté en cas de gros foyers de pucerons noirs. Un produit respectant les auxiliaires présents. Veillez au delai avant récolte.

POMME DE TERRE PRIMEUR

MILDIOU

COTES D'ARMOR

Les tâches observées cette semaine sont sèches, et compte tenu des fortes chaleurs, on n'en dénombre pas beaucoup de nouvelles. Les fructifications, elles aussi, se font rares.

La météo prévoit des risques d'orages ce week-end, suivis de chaleurs modérées pour la semaine à venir (maximales :25° en moyenne).

Indice de sporulation : 10 sur 10 ; les risques de contamination restent donc importants. Cumul moyen de pluviométrie (7 derniers jours):0 mm.

Maintenir une protection avec un produit de contact protégeant les tubercules. Attention au délai avant récolte des produits employés.

FINISTERE

Le temps chaud et sec de la semaine passée semble avoir asséché les tâches des parcelles de ce secteur et bloqué la progression du mildiou. On n'observe d'ailleurs pas de nouvelles tâches ni de fructifications. Néanmoins, le temps orageux prévu pour le week-end risque de relancer les contaminations car les risques sont toujours importants.

La météo prévoit un temps orageux suivi de chaleurs modérées pour la semaine à venir (maximales:25° en moyenne).

Indice de sporulation : 10 sur 10

Cumul moyen de pluviométrie (7 derniers jours): 0 mm.

Maintenir une protection avec un produit de contact protégeant les tubercules. Attention au délai avant récolte des produits employés.



Prochain bulletin : 1er juillet 2005



Artichaut

Augmentation des pucerons noirs dans le Finistère. Traiter en local, en respectant les auxiliaires.

Pomme de terre primeur

Les risques d'orages relance le mildiou. Maintenir une protection fongicide pour protéger les tubercules.

Chou

Début du second vol de la mouche du chou dans l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor.

Imprimé à la station

d'Avertissements Agricoles

Protection des Végétaux

280 rue de fougères

DRAF Bretagne Service Régional de la

de Rennes Directeur gérant : P. MICHON Publication périodique C.P.P.A.P n°528 AD ISSN n°1167-2382

BnF SaT

09

23 40 50 43 158

1/2

ILLE ET VILAINE

Dans ce département, la manifestation de la maladie se résume également à des tâches très sèches, rarement accompagnées de fructifications.

Les risques de contamination sur ce secteur restent élevés.

L'indice de sporulation est actuellement de 10 sur 10.

La météo prévoit des risques d'orages ce week-end, suivis de chaleurs modérées pour la semaine à venir (maximales :25° en moyenne).

Cumul moyen de pluviométrie (7 derniers jours): 0 mm.

Maintenir une protection avec un produit de contact protégeant les tubercules.

Attention au délai avant récolte des produits employés.

Situation sanitaire mildiou des parcelles de pommes de terre suivies dans les Côtes d'Armor, le Finistère, et l'Ille et Vilaine - 2005				
Région	classe	1 pas de symptômes	2 Qq symptômes pas de foyers	3 Foyer(s) constitué(s)
22	Côtes d'Armor	aucune parcelle	toutes les parcelles	aucune parcelle
29	St Pol de Léon	aucune parcelle	toutes les parcelles	aucune parcelle
	Le Conquet	aucune parcelle	toutes les parcelles	aucune parcelle
	Ploudalmézeau	aucune parcelle	toutes les parcelles	aucune parcelle
35	Ille et Vilaine	aucune parcelle	toutes les parcelles	aucune parcelle

CHOU

MOUCHE DU CHOU

FINISTERE

Toujours très peu de pontes observées dans ce secteur (0.44 œuf par pied)

Le seuil de nuisibilité n'étant pas atteint, la protection des parcelles reste inutile pour le moment.

ILLE ET VILAINE

La moyenne de ponte est de 17.6 œufs par pied cette semaine. Le second vol de mouche du chou se confirme. Le seuil de 7 œufs par pied est largement dépassé.

La protection des parcelles est donc nécessaire pour les plantations non protégées.

COTES D'ARMOR

Le second vol est là aussi amorcé, puisque la moyenne passe de 3.6 à 16.8 œufs par pied cette semaine.

La protection des parcelles est donc nécessaire pour les plantations non protégées.

